

The logo for PASCOLEUCYN N Tropfen features a large, light grey 'C' shape on the left. To its right, the text 'PASCOLEUCYN® N' is written in a bold, black, sans-serif font. Below this, the word 'Tropfen' is written in a smaller, black, sans-serif font.

# PASCOLEUCYN® N Tropfen

**Zusammensetzung:** 10 g (= 11 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Echinacea Ø 4 g, Baptisia (HAB 1934) Ø (HAB, Vorschrift 3a) 2,35 g, Eupatorium perfoliatum Ø 2,5 g, Thuja Dil. D1 1 g, Lachesis Dil. D8 0,15 g.  
Enthält 65 Vol.-% Alkohol.

**Darreichungsform und Inhalt:** Originalflaschen zu 20 ml, 50 ml und 100 ml Mischung.

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

**Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:** PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl 35383 Giessen, Telefon (0641) 7960-0, Telefax (0641) 7960-109, e-mail: info@pascoe.de.

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten.

Bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

#### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie PASCOLEUCYN® N Tropfen nicht anwenden?*

PASCOLEUCYN® N Tropfen sollten von Alkoholkranken und bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler nicht eingenommen werden.

Aus grundsätzlichen Erwägungen dürfen PASCOLEUCYN® N Tropfen nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Siehe unter Punkt Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollten PASCOLEUCYN® N Tropfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.



**Dosierungsanleitung:** Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3-mal täglich je 5 Tropfen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Säuglinge bis zum ersten Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1–2 Tropfen; bei chronischen 1–3-mal täglich 1–2 Tropfen.

Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich 2–3 Tropfen; bei chronischen Zuständen 1–3 mal täglich 2–3 Tropfen.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich 3–4 Tropfen; bei chronischen Zuständen 1–3-mal täglich 3–4 Tropfen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

1 g PASCOLEUCYN® N Tropfen entspricht 53 Tropfen.

**Art der Anwendung:** PASCOLEUCYN® N Tropfen werden mit etwas Flüssigkeit eingenommen. Da die Aufnahme über die Mundschleimhaut die Wirkung intensiviert, sollten die Tropfen einige Zeit im Munde belassen werden.

**Dauer der Anwendung:** PASCOLEUCYN® N Tropfen sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** In Einzelfällen können bei Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Es wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Nach Ablauf des auf Flasche und Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Bei PASCOLEUCYN® N Tropfen können auf Grund des hohen Gehaltes an Urtinkturen natürliche Trübungen und Ausflockungen auftreten. Bitte schütteln Sie in diesem Fall den Inhalt der Flasche kurz auf und bewahren Sie die Flasche nach Gebrauch stets gut verschlossen und vor Licht geschützt auf.

**Datum der Fassung:** 15.09.2005